

# Händedesinfektion

ZUR HÄNDEDESINFEKTION UND FÜR KÜHLUMSCHLÄGE  
2-PROPANOL 70 % (V/V) LÖSUNG

**INTERMED**  
**S E R V I C E**



## CHARAKTERISTIKA

- dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen
- parfümfrei
- frei von Zusatzstoffen
- Rota-Viren inaktivierend
- begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren)

## ANWENDUNGSBEREICHE/HANDHABUNG

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion.

## GEGENANZEIGEN

Intermed Händedesinfektion ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

## WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Keine bekannt.

## NEBENWIRKUNGEN

Beim Einreiben der Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

## MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn (www.bfarm.) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

## ZUSAMMENSETZUNG

100 g Lösung enthalten: Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g;  
sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser.

## MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- levurozid
- Rota-Viren inaktivierend
- begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vakzinia-Viren)

## KONZENTRATION UND EINWIRKZEITEN

Hygienische Händedesinfektion  
gemäß VAH/DGHM/EN 1500

konz. 30 s

Chirurgische Händedesinfektion  
gemäß VAH/DGHM/EN 12791  
gemäß Arzneimittelgesetz

konz. 1,5 min  
konz. 5 min

Für Kühllumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

## HINWEISE

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzungen der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Intermed Händedesinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

## LISTUNG UND ZULASSUNG

- VAH/DGHM-gelistet
- Zugelassen nach AMG in Deutschland ( Zu.-Nr.: 1599.98.99)

## WARNHINWEISE

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fern halten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

## LIEFERFORMEN

500 mL-Flasche  
5 L-Kanister

Best.-Nr.: 213941  
Best.-Nr.: 210015

1 L-Flasche Best.-Nr.: 210041

Hersteller/  
Pharmazeutischer Unternehmer:  
Dr. Schumacher GmbH  
Am Roggenfeld 3 • 34323 Malsfeld  
Tel. 0 56 64 - 94 96-0

ISG Intermed Service GmbH & Co. KG • Spandauer Str. 24-26 • D - 21502 Geesthacht  
freecall 0800 0850-113 • freefax 0800 0850-114 • www.intermed.de

Stand der Informationen: 08/2015  
Stand 01/2016